

ŁĘG RYBITWY BIAŁOCZELNEJ (STERNA ALBIFRONS) NA ZBIORNIKU MIETKOWSKIM

W r. 1989 po ok. 80-letniej przerwie, stwierdzono gnieźdzenie się rybitwy białoczelnnej na Śląsku. Fakt ten miał miejsce na Zbiorniku Mietkowskim (woj. wrocławskie). 24 czerwca 1989 r. podczas kontroli zbiornika znaleziono na jednej ze sztucznych wysp dwa zajęte gniazda tego gatunku. Każde z nich zawierało po 2 jaja w początkowym stadium wysiadywania. Następnego dnia stwierdzono 8 rybitw białoczelnnych, a także obserwowano toki i karmienie samicy przez samca. 8 VII 89 spenetrowano wszystkie wyspy i stwierdzono, że jeden łęg został zniszczony, a w drugim wysiadywanie jest bardzo zaawansowane. Ponadto w tym dniu na zbiorniku widziano 5 dorosłych rybitw. 26 VII podczas kontroli wyspy, na której znaleziono gniazda, stwierdzono silnie zaniepokojoną parę, ale piskląt nie udało się odszukać.

Rybitwa białoczelnna gnieździła się na Śląsku jeszcze na początku XX wieku w okolicach Krosna Odrz., gdzie była w tym czasie liczny gatunkiem łęgowym (Schalow 1919). Być może gnieździła się ona w r. 1939 na Odrze k. Oławy, gdzie kilkakrotnie obserwowano ją w porze łęgowej, a w końcu lipca widziano parę karmiącą lotnego młodego (Krampitz i Schlott 1940). W późniejszym okresie brak jest nawet podejrzeń o łęgi tego gatunku na Śląsku.

Zwraca uwagę rola sztucznych wysp w gnieźdzeniu się ptaków wodnych na Zb. Mietkowskim. Oprócz rybitwy białoczelnnej gnieździły się tam rybitwy zwyczajne (5-6 par) i śmieszki (kilkadziesiąt par) i kilka gatunków kaczek (płaskonos, cyranka, czernica). 25 VI widziano zaniepokojoną parę mew pospolitych, a także 2-4 dorosłe mewy srebrzyste trzymające się w kolonii śmieszki. Na Śląsku istnieje kilka dużych zbiorników zaporowych, ale niestety większość bez wysp. W przyszłości mają powstać je-

szcze dwa zbiorniki na Nysie Kłodzkiej. Warto więc chyba zadbać, aby przy ich budowie uwzględniono również interesy ptaków.

Tadeusz Drazny, Wiesław Tabisz, Dariusz Olej

Literatura

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J., w druku.

Ptaki Śląska - monografia faunistyczna. Wrocław.

Krampitz H., Schlott M. 1940. Zum vorkommen der Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*) in Schlesien. Ber. Ver. schles. Orn. 25: 25-26.

Schalow H. 1919. Beitrage zur Vogelfauna der Mark Brandenburg. Berlin.

Breeding of Little Tern at Mietków Reservoir

On 24th June 1989 two nests of Little Tern were found on the artificial island at Mietków Reservoir. Each nest contained two eggs in the first stage of the incubation. One brood was destroyed but from the second one nestlings hatched. This is the first breeding record of this species in Silesia since 80 years.