

LĘGI CZAPLI PURPUROWEJ (ARDEA PURPUREA) NA STAWACH MILICKICH

W latach 1988-90 w rezerwacie "Stawy milickie" stwierdziliśmy gnieźdzenie się czapli purpurowej. 8 V 88 na stawie Henryk (kompleks Stawno) znaleziono gniazdo z jednym jajem (KF 2659/88). Dwa dni później w gnieździe znajdowały się trzy jaja. Następna kontrola przeprowadzona 14 V wykazała, że lęg został splądrowany, prawdopodobnie przez błotniaka stawowego (*Circus aeruginosus*). W gnieździe znajdowały się skorupki 4 jaj.

W r. 1989 ponownie stwierdzono lęg tego gatunku. Tym razem czaple zagnieździły się na stawie Andrzej (kompleks Stawno). Gniazdo zostało znalezione 9 VI 89 i zawierało ono trzy jaja (KF 2950/89). 17 VI w gnieździe były 4 jaja. Podczas następnej kontroli (11 VII) stwierdzono, że z trzech wykluły się już pisklęta, a czwarte jajo było niezależone. Ostatecznie czaplom udało się odchowić dwa młode. Prawdopodobnie druga para czapli purpurowej gnieździła się w r. 1989 na stawie Henryk lub Grabownica, nad którymi widywano osobniki, ale gniazda nie szukano.

Po raz kolejny lęg czapli purpurowej został stwierdzony w r. 1990. 28 V na stawie Andrzej, na którym czaple gnieździły się w poprzednim sezonie obserwowano jednego osobnika. 13 VI znaleziono tam gniazdo zawierające 5 jaj, położone w odległości dwóch metrów od zeszłorocznego gniazda. 30 VI znajdowało się w nim jedno pisklę i cztery jaja, w tym jedno z kłującym się pisklciem. Następne kontrole wykazały, że ze wszystkich jaj wykluły się pisklęta. Podczas ostatniej kontroli (28 VII) stwierdzono, że jedno z nich padło, tak więc ostatecznie czaple prawdopodobnie wyprowadziły cztery młode.

Stawy w dolinie Baryczy są miejscem, gdzie lęgi czapli purpurowej są najczęściej stwierdzane w Polsce. Tylko w okresie powojennym zanotowano 11 pewnych stwierdzeń gnieźdzenia się tego gatunku na tym terenie (Dyrz i in., w druku). Lęgowe czaple purpurowe stwierdzano także na stawach k. Oświęcimia, na stawach "Okręt" k. Łowicza oraz na Jez. Gopło (Tomiałoć 1990).

Józef Witkowski, Beata Orłowska

Literatura

- Dyrz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J., w druku.
 Ptaki Śląska - monografia faunistyczna. Wrocław.
 Tomiałoć L. 1990. Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność.
 Warszawa.

Breeding records of Purple Heron (*Ardea purpurea*) on the Milicz Ponds

In 1988-90 breeding pairs of Purple Heron were recorded on fish ponds (Stawno complex) in the Barycz valley. In 1988 herons laid first egg on 8th May. The attempt at breeding was unsuccessful and brood with four eggs was destroyed, probably by Marsh Harrier. In 1989 a pair of Purple Heron built a nest on another pond in Stawno complex. The female laid four eggs but one was unfertilized. Herons raised two young. In 1990 Purple Herons nested on the same pond. They built nest two meters from the previous year nest. They laid five eggs and from all of them nestlings hatched. The pair raised four young. Records accepted by the Faunistic Commission.